



Välkommen till endoskopimottagningen USÖ

Anmälan: Anmäl dig vid informationsdisken på entréplan vid entré B 15 minuter innan planerad undersökning. Du kan använda självcheckning.

Gå till: Entré B, ta hiss B1 till våning 1 och sätt dig i väntrummet.

Besöket avser: Koloskopi, vilket innebär bedömning av din tjocktarm. Du får besked om eventuella fynd i samband med undersökningen. Läkaren som skickade remissen ansvarar dock för helhetsbedömningen av dina symtom.

Det är svårt att bedöma med säkerhet hur lång tid det tar vid våra undersökningar beroende på vad man hittar. Detta gör att väntetid kan uppstå på mottagningen. Anhöriga hänvisas till väntrummet.

Förberedelser: Du behöver anpassa kosten före din undersökning, var god se informationsblad "Förberedelse inför koloskopi".

Recept på laxering är skriven, hämtas ut på valfritt apotek i god tid inför undersökningen. Om recept saknas ta kontakt med endoskopimottagningen.

Du får inte köra bil på undersökningdagen på grund av de läkemedel som kan ges i samband med undersökningen.

Tolk: Behövs tolk, kontakta oss snarast.

Undvik starka dofter: Många blir sjuka av starka dofter. Undvik parfymer, deodorant eller tvål som luktar starkt



Förberedelse inför koloskopiundersökning

Det krävs att tarmen är väl rengjord inför undersökningen. Om det finns kvar tarminnehåll kan undersökningen bli mer smärtsam för dig, och det finns risk att sjukliga förändringar döljs av avföringen.

Vistaprep® är ett läkemedel som används för att tömma tarmen. Det är en lösning som innehåller salter och andra ämnen för att skölja tarmen ren. Följ instruktionerna noggrant.

Veckan innan undersökningen

- Hämta ut Vistaprep på valfritt apotek. Recept har skickats elektroniskt.
- Tre dagar innan koloskopin ska du äta en fiberfattig kost. Du ska undvika fullkornsprodukter, müsli, svamp, grönsaker och frukt samt nötter och frön.
- **Det går bra att äta:** kött, fisk, fågel, quorn, tofu, oumph, potatis, vit pasta, vitt ris, vitt bröd och mejeriprodukter utan fruktbitar, ägg, risgryns-/mannagrynsgröt
- **Har du förstoppningsproblematik** rekommenderar vi Movicol/Forlax (receptfritt på apoteket) 2 doser/dag, 5 dagar före laxeringsstart. Bulkmedel liknande Inolaxol och Vi-Siblin ska du däremot undvika.
- **Om du äter järntabletter** ska du sluta med dessa 7 dagar innan undersökningdagen.
- Är du diabetiker? Diskutera med din diabetessköterska angående laxering och insulinjustering. Kontrollera ditt blodsocker noggrant under förberedelserna.
- Det här gäller om du behandlas med följande läkemedel:
 - Waran - remiss är skickad för nedtrappning. Kontakta din AK-mottagning.
 - Eliquis, Xarelto, Pradaxa, Lixiana - gör uppehåll 2 dagar innan undersökningen.
 - Plavix/Clopidogrel, Prasugrel, Brilique, Efient - gör uppehåll 7 dagar innan undersökningen
 - Trombyl/Acetylsalicylsyra kan du fortsätta med som vanligt.

Gör **inte** uppehåll med medicinen om du:

- har njursvikt
- har en mekanisk hjärklaff
- har genomgått kranskärlsröntgen med ballongsprängning senaste året
- har fått behandlingen för blodproppar senaste tre månaderna

Kontakta din ordinarie läkare eller AK-mottagningen för att diskutera hur du ska göra.

Övriga mediciner kan du ta som vanligt, även på morgonen inför undersökningen.

Dagen före undersökningen

Dagen innan din undersökning ska du äta en liten frukost och en lätt lunch. Därefter ska du inte äta någon mer fast föda, men du får dricka fritt med klara vätskor såsom läsk, saft, äppeljuice, buljong, sportdryck och kaffe/te utan mjölk. Det är bra att dricka mycket. **Du får dricka fram till 2 timmar innan undersökningen.**

Laxering Vistaprep dos 1: efter kl. 16.00 dagen före undersökningen.

- Öppna förpackningen och ta ut två dospåsar. Varje dospåse ska blandas med 1 liter vatten, totalt 2 liter lösning.
- Drink lösningen i portioner om 2-3 deciliter var 10:e minut till du fått i dig allt.

På undersökningsdagen

Laxering Vistaprep dos 2: på morgonen 4-5 timmar före undersökningen.

Ex har du en tid kl 08.00 ska du börja dricka Vistaprep kl 04.00

- Öppna förpackningen och ta ut två dospåsar. Varje dospåse ska blandas med 1 liter vatten, totalt 2 liter lösning.
- Drink lösningen i portioner om 2-3 deciliter var 10:e minut till du fått i dig allt.

Tips:

Du bör ha en toalett i din närhet. Det kan också vara bra att skydda huden kring ändtarmsöppningen genom att smörja med en fet hudsalva.

Laxeringseffekten ökar om du rör på dig så mycket som möjligt.

Om du har svårigheter att dricka lösningen, kyl den ordentligt och pröva med sugrör, då blir smaken inte lika intensiv.